

稲作情報



No.4 「べんとう肥～本田除草」

JAえちご中越 さんとう営農センター
TEL: 0258 (41) 2887

令和5年 4月10日

「べんとう肥」の施用で“健苗”仕上げ!! 健苗移植で良質茎を早期に確保しましょう!!

1. 移植前追肥 (べんとう肥)


液肥散布後は葉面についた肥料を洗い流すイメージでたっぷりかん水しましょう!

資材名	使用量		備考
	1箱あたり	10aあたり	
くみあい液肥2号	10g以内	200g以内	200倍以上
尿素	2g以内	40g以内	10aあたり20箱以内
べんとう肥	20g以内	400g以内	

おすすめ!

★ べんとう肥施用のポイント ★

- ① 胚乳からの栄養源を失った苗の老化防止と移植後の活着を促進させるため、移植前4～5日(1.8葉期)頃に施用します。
- ② 1箱あたりの施肥量が、N成分で1～2gとなるよう肥料溶液を散布した後、十分かん水して肥料ヤケを防ぎましょう。
- ③ 軟弱苗・徒長苗の場合でも、移植直前の追肥で活着・初期生育が促進されます。
- ④ プール育苗の場合は箱上まで水を張り、窒素成分で1箱あたり約1～2g相当となるよう肥料を施用し、施用後は2日間落水ないようにしましょう。



2. 田植え

品種特性に合わせた移植適期に移植しましょう。また、適正な「栽植密度・植付本数・植付深さ」の移植作業で早期に良質茎を確保しましょう!!

(1) 田植え時期

天候の安定する5/5以降を目安に移植作業を開始しましょう!!

植え傷みによる「初期生育の停滞」を避けるため、天候不順日(特に低温・強風時)の移植作業は避けてください!!

(2) 栽植密度 60株/坪

※ 転作あとや基盤整備あと、過剰生育が懸念される場合は、疎植(50株以下/坪)とします。

(3) 植付本数 3～5本/株

過繁茂防止のため植付本数を確認しながら作業しましょう!また、品種やほ場条件を考慮して植付本数を調整してください!!

(4) 植付深さ 3cm程度の浅植え

トラクターなどで道路に落としてしまった土や泥は、速やかに清掃しましょう!!

3. 初期病害虫の防除対策

5割減栽培では、本田で殺虫剤が使用できません。必ず、育苗箱処理剤で病害虫防除を徹底しましょう!

資材名	適用病害虫名	使用量	使用時期
パディート箱粒剤	フタオビコヤガ、ニカメイチュウ、イネミズゾウムシほか	50g/箱	播種前(床土混和)、播種時、覆土前～移植当日 *1箱あたり使用量:50gをしっかりと施用します!!
ツインパディート箱粒剤	いもち病、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ、イネミズゾウムシほか	50g/箱	*密播・密苗は、「10aあたり使用量1kg」をめやすに1箱あたり使用量を調整(50～100g/1箱)します!!

◆ いもち病の常発地域、発生しやすいほ場・品種(わたぼうし、新之助など)では、ツインパディート箱粒剤を必ず活用し、いもち病の予防防除に努めて下さい。⇒ 初発前の「予防防除」が重要です!!

4. 本田雑草の防除対策

* 剤型により水深目安が異なるので注意が必要です!(水深スケールの活用)

* 浮き苗や水深の浅すぎは、薬害の発生リスクが高まるので注意しましょう!

1 本田除草剤の登録内容と使用時期の確認



(1) 本田除草剤(初期剤・初中期一発剤)の登録内容

使用区分	使用資材名	10aあたり使用量	使用時期(移植水稻)	除草剤散布時の水深目安	
初期処理	メテオ	1キロ粒剤	1kg	植代後～移植7日前、移植時、移植直後～移植後30日まで	3cm以上
		フロアブル	500ml		5cm以上
		ジャンボ	10個(300g)		7cm以上
初中期一発処理	エンペラー	1キロ粒剤	1kg	移植時～移植直後～収穫75日前まで	3cm以上
		フロアブル	500ml		5cm以上
		豆つぶ250	250g	移植直後～収穫75日前まで	7cm以上
		ジャンボ	10個(250g)		7cm以上

注意! 薬害の恐れがあるので、水深をしっかりと確保してから除草剤を散布しましょう。豆つぶ・ジャンボ剤は強風時の使用を避け、風の影響が少ない時間帯(朝・夕)に散布しましょう。

(2) 雑草の発生と生育

雑草の発生は「代かき直後」からはじまります!!



裏面もご覧下さい!!


2 代かき後日数と本田除草剤（初期剤・初中期一発剤）の処理時期の目安

ノビエ (葉数)	ホタルイ (葉数)	代かき後日数	メテオ (粒剤・フロアブル・ジャンボ) の処理限界	エンペラー (粒剤・フロアブル・豆つぶ・ジャンボ) の処理限界
-	0.5~1.0	5	ノビエ: 1葉期まで ホタルイ: 発生前~発生始期まで	ノビエ: 3葉期まで ホタルイ: 3葉期まで
1.2~1.8	1.0~1.5	7		
2.0~2.1	1.5~2.0	10		
2.7~2.8	2.0~3.0	12		
3.3~3.5	3.0~3.5	15		
4.0~4.3	3.5~4.5	20		
-	4.5~5.0	25		

雑草の生育と代かき後日数を考慮して、「**早め**」に除草剤を使用することが重要です!!



3 除草体系の検討



4 本田除草剤（初期剤・初中期一発剤）の散布適期の確認

「登録の範囲内」でできる限り雑草の小さいうちに確実に防除します!!
→ 雪消え以降、例年のない「高温気象」が続いていることから、雑草の発生時期や生育が早まっています。下図を参考に、散布適期の範囲内における**早め**（雑草・藻類の発生前~発生初期）の除草剤使用により、**雑草の発生防止に努めて下さい!!**

① **一発処理パターン**: 気象予報を確認し、出来るだけ**早め**に散布しましょう!

★【**処理限界**】★
代かき後10日頃まで

雑草の生育を確認しながら、早めに!

代かき 田植え

エンペラー (粒剤・フロアブル) 散布適期 * 移植時、移植直後~ノビエ3葉期

エンペラー (豆つぶ・ジャンボ) 散布適期 * 移植直後~ノビエ3葉期

② **体系処理パターン①**: 田植え後（田植え同時）に初期剤（メテオ）を使用する場合

代かき 田植え 田植え後5日頃まで 初期剤散布後7日頃から 初期剤散布後12日頃まで

メテオ 散布適期

エンペラー (粒剤・フロアブル・豆つぶ・ジャンボ) 散布適期

田植え後代かき~5日以内に散布

田植え後に初期剤を使用する場合は、雑草の発生前から発生初期までに!!

③ **体系処理パターン②**: やむを得ず、代かきから田植えまでの日数が7日以上となる場合

★初期除草剤の使用は、河川への流出を防止（環境への配慮）するため、移植前の使用を極力控え、移植後の使用を基本としましょう!!

やむを得ず、移植前に初期除草剤を使用する場合は、必ず「田植え7日前まで」に散布しましょう!!

代かき 代かき後5日頃まで 田植え 初期剤散布後12日頃まで

メテオ 散布適期 ← 初期剤メテオ 田植え前処理 → 田植え7日前まで

エンペラー (粒剤・フロアブル) エンペラー (豆つぶ・ジャンボ) 散布適期 * 移植時~ * 移植直後~

* 1 除草剤散布後7日間は、止水管理（入水・落水・かけ流しをしない）としましょう。
* 2 気温や水田状況（保水力・雑草発生状況など）により、雑草の発生時期が異なります。発生してからでは手遅れになります。適期散布と適正な水管理を徹底しましょう!!



営農情報LINE 営業中(*!w!)!

営農・稲作に関する情報を
随時・迅速に配信しています

LINEアプリの[ホーム]から
[友だち追加] > [QRコード]で
右のQRコードを読み取ってネ!



「友だち登録」お待ちしております!! m(_)_m

~~営農情報のお問い合わせは、お気軽に最寄りの営農センターへ~~