

高温に耐えられる後期栄養確保・土づくり・作期分散と基本技術の実践で品質をV字回復！ 品質と安全性で信頼される環境保全型稲作「エコ・5-5 運動」をさらに前進！

【エコ・5-5 コシヒカリ目標値:1等米比率 90%以上、整粒歩合 75%以上、玄米タンパク質 5.5~6.0%】

目標収量と収量構成要素

Table with 7 columns: 収量 (kg/10a), 穂数 (本/m²), 1穂粒数 (粒), m²当り粒数 (千粒), 登熟歩合 (%), 千粒重 (g). Values: 480, 340, 22(50株セット), 77, 26, 87, 22.0

Main cultivation calendar diagram showing stages from April to September. Includes sections for '生育ステージと作業スケジュール' (Growth stages and work schedule), '根域が拡大され高温に強くなります！' (Root zone expands and becomes strong against high temperature), '茎数(本/株)' (Stems per plant), '草丈(cm)' (Plant height), '葉数(葉)' (Number of leaves), '中干し開始' (Start of mid-drying), '最高分け時期' (Peak panicle division time), '幼穂形成期' (Young panicle formation period), 'カラスケールによる穂肥' (Panicle fertilizer using Kurascale), 'イボ竹' (Ibonake), '飽水管理のイメージ' (Image of waterlogging management), '最終かん水日 8月末以降' (Final irrigation date after end of August), '初黄化率90%のめやす' (Target for 90% initial yellowing rate), '成熟期の積算温度のめやす 1,000℃' (Target for cumulative temperature in maturity period 1,000°C), and '※高温年は50℃早める' (In high temperature years, start 50°C earlier).

Management points table with columns for months [4月], [5月], [6月], [7月], [8月], [9月~10月]. Includes sections for '水管理' (Water management), '保温的水管理→活着後は浅水管理' (Insulating water management → shallow water management after establishment), '小ヒビ中干し' (Small cracks mid-drying), '飽水管理' (Waterlogging management), and '胴割れ防止！' (Prevention of hull splitting!).

使用肥料と施肥の目安

Fertilizer and application guidelines table with columns: 区分 (Category), 肥料名 (Fertilizer name), 使用基準 (Usage criteria), 10a当り施用量 (Application rate per 10a). Categories include 土づくり (Soil preparation), 育苗 (Seedling), 田植前追肥 (Pre-planting topdressing), 基肥 (Base fertilizer), 全量基肥肥料 (Full base fertilizer), ケイ酸質肥料 (Silica fertilizer), and 穂肥 (Panicle fertilizer).

使用可能な農薬と使用回数 決められた農薬を予防重点で使用してください。

Pesticide and application frequency table with columns: 区分 (Category), 農薬名 (Pesticide name), 使用 (Usage), 使用回数の制限 (Limit on number of applications). Categories include 種子病害の予防剤 (Seed disease prevention), 初期害虫の予防剤 (Initial pest prevention), 水田除草剤 (Paddy field herbicide), いもち病予防剤 (Bacterial blight prevention), 紋枯病予防剤 (Sheath blight prevention), カメムシ類の防除 (Stink bug control), 稲こうじ病予防剤 (Rice sheath blight prevention), 紋枯病防除剤 (Sheath blight control), and いもち病防除剤 (Bacterial blight control).

Additional management notes and images. Includes '本田初期害虫は「ゼロカウント粒剤」で予防を徹底！' (Thorough prevention of initial field pests with 'Zero Count' granules), '除草効果を高めるため、畦畔の漏水防止と代かき時の田面均平化に努め、移植後は除草剤の適用条件内で早めに処理しましょう！' (Efforts to improve weeding effectiveness, prevent leakage on the ridge, and level the field during transplanting), 'スタークル共同防除と雑草管理で斑点米カメムシの発生を防ごう！' (Prevention of spotted rice stink bug with Starckle joint control and weed management), and '注意事項' (Precautions) regarding production management and pesticide use.

*; 上限値。但し、基肥量が上限値未満の場合(分施・全量基肥肥料とも)は、化学合成窒素成分の残量相当量を穂肥として追加施用することが可能です。詳細な施肥量はお近くの営農センターに相談してから施用して下さい。

(農業確認令和6年2月14日)

お問い合わせは最寄りの営農センターへ