

大麦情報

No. 3

JA えちご中越 さんとう営農センター
電話番号(0258)41-2887

令和7年6月2日

“収穫期は平年並みと予想されます！”
現場で収穫適期を確認し、好天を逃さず収穫作業の体制を整えましょう！

ミノリムギの生育状況

本年の大麦出穂期は、寺泊・和島・出雲崎地域で4月24～30日、三島地域は4月30日で、出穂期は平年並みとなっています。管内の出穂盛期は4月25日頃で平年並、前年より5日程度遅れている状況です。（＊ほ場間の出穂盛期差が大きい）


今後の天候等（1ヵ月予報：平均気温高い見込み）によって収穫期が前後します。積算気温表を参考に作業計画を立て、ほ場ごとの成熟状況を確認した上で収穫作業を開始しましょう！！



1. 収穫作業

適期収穫による“白未熟粒”・“空洞粒”の発生防止！

(1) 収穫時期の判断



(2) 収穫適期予想（5月19日現在）（アメダスデータ 5月19日まで本年値、それ以降平年値）

地域名	出穂期	成熟期 (650℃～700℃)	収穫適期（目安） (700℃～800℃)	アメダス地点
寺泊 和島	4月24日～4月27日	6月2日～6月7日	6月5日～6月9日	寺泊・長岡平均
出雲崎	4月23日～4月30日	6月2日～6月9日	6月5日～6月12日	
三島	4月30日	6月5日～6月6日	6月7日～6月9日	長岡

※ 成熟期・収穫適期（目安）は、三島地域は「長岡」、寺泊・和島・出雲崎地域は「寺泊」と「長岡」のアメダス地点の平均値を基に算出しています。【右上表】

※ ほ場条件や天候等により前後しますので、必ず成熟状況を確認し、収穫作業を開始して下さい。

※ 赤かび病防除剤の収穫前日数（チルト乳剤 25：収穫 21 日前まで）が使用基準内であることを確認してから、収穫作業を開始して下さい。

早刈り厳禁!! 好天が予想される場合は、収穫適期幅の中でやや遅めに収穫しましょう！

【地区別の積算気温表】

収穫適期：○の範囲（△成熟期、○収穫時期）

出穂期	地域名	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14
4/24	夏戸、五分一、島崎、松本	625	644 △	663 △	682 △	702 ○	721 ○	741 ○	761 ○	781 ○	801	821	842	862	882
4/25	乙茂	612	631	650 △	670 △	689 △	709 ○	729 ○	748 ○	768 ○	789 ○	809	829	850	870
4/26	吉水、滝谷、神条、沢田	600	619	638	657 △	677 △	696 △	716 ○	736 ○	756 ○	776 ○	796 ○	817	837	858
4/28	稲川	569	588	607	626	646 △	665 △	685 △	705 ○	725 ○	745 ○	766 ○	786 ○	806	827
4/30	三島	574	595	616	637	658 △	679 △	700 △	721 ○	742 ○	763 ○	784 ○	805 ○	826	847

※上表は積算気温による収穫適期の目安です。ほ場条件や今後の天候等により前後する場合がありますので、現場確認（子実水分：30%以下）を行った上で適期収穫に努めてください。

(3) 「適期収穫による品質低下の防止」

早刈り厳禁！

近年は、出荷量の大半が「未熟粒」の混入（⇒“早刈り”が主要因）により格落ちしている状況です。

- 刈り取り前のほ場で、赤かび・麦角粒の発病状況を確認し、一定以上発病がある場合には、刈り分けしてください。
- 週間予報等を確認し雨天が続く場合は、刈遅れによる「かび粒」増加を防止するため、“早め”に収穫してください。

早刈り

白色未熟粒・空洞粒の発生

刈遅れ

色粒・発芽粒・かび粒の発生

品質低下↓

2. 施設稼働計画（予定）

- (1) 荷受期間 北部地区 和島 RC：6月5日（木）～
北部地区 出雲崎 RC：6月5日（木）～
中部地区 長岡西 CE：6月5日（木）～
（RC 荷受後 JA で長岡西 CE に運搬します）
- (2) 荷受時間 北部地区 9：00～17：00 まで
中部地区 9：00～18：00 まで
（※ 刈り取り時間は出来る限り遅く開始するようにお願いします。）

【施設利用にあたっての注意事項】

- 刈り取りに際して事前に刈り取り開始日の連絡をお願いします！（今後の天候により収穫期が前後することも想定されます。期間の変更も検討させていただきますのでご相談下さい。）
- 品質事故防止のため、荷受水分が 30%を超えた場合は刈り取り作業及び持ち込みの停止を指示させていただきます。刈り取り前に、ほ場数ヶ所から平均的な穂を数点お持ち込みいただき、水分を確認のうえ、作業を開始していただくをお願いします。
- 収穫適期・天候の状況等を踏まえ、好天が続く時期に刈り取るようお願いします。
- 「麦角粒」混入防止のため、収穫前にほ場内の発生状況を確認し刈取可否を判断して下さい。
- 「赤かび病」混入防止のため、発病率が 0.03%以上のほ場は必ず刈り分けして下さい。荷受検査で「赤かび病・麦角粒」の混入が確認された場合は別処理対応となります。

～～営農情報のお問い合わせは、お気軽に最寄りの地区営農センターへ～～