

大麦情報

No. 3

JAえちご中越 さんとう営農センター
電話番号(0258)41-2887

令和8年5月27日

“収穫期は平年並み～やや早いと予想されます！”
現場で収穫適期を確認し、好天を逃さず収穫作業の体制を整えましょう！

ミノリムギの生育状況

本年の大麦出穂期は、寺泊・和島・出雲崎地域で4月21～5月3日、三島地域は4月26日で、出穂期は平年よりやや早くなっています。長岡地域管内の出穂盛期は4月24日頃で平年並となっています。（*ほ場間の出穂盛期差あり）


今後の天候等（1ヵ月予報：平均気温高い見込み）によって収穫期が前後します。積算気温表を参考に作業計画を立て、ほ場ごとの成熟状況を確認した上で収穫作業を開始しましょう！！



1. 収穫作業

適期収穫による“白未熟粒”・“空洞粒”の発生防止！

(1) 収穫時期の判断



(2) 収穫適期予想（5月19日現在）（アメダスデータ 5月19日まで本年値、それ以降平年値）

| 地域名 | 出穂期 | 成熟期 (650℃～700℃) | 収穫適期 (目安) (700℃～800℃) | アメダス地点 |
|----------|------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 寺泊 和島 | 4月21日 | 5月30日～6月1日 | 6月2日～6月6日 | 寺泊 |
| 出雲崎 | 4月21日～5月3日 | 5月30日～6月9日 | 6月2日～6月15日 | |
| 三島 | 4月26日 | 6月1日～6月2日 | 6月3日～6月7日 | 長岡 |

※ 成熟期・収穫適期（目安）は、三島地域は「長岡」、寺泊・和島・出雲崎地域は「寺泊」のアメダス地点の平均気温で算出しています。【右上表】

※ ほ場条件や天候等により前後しますので、必ず成熟状況を確認し、収穫作業を開始して下さい。

※ 赤かび病防除剤の収穫前日数（チルト乳剤 25：収穫 21 日前まで）が使用基準内であることを確認してから、収穫作業を開始して下さい。

早刈り厳禁!! 好天が予想される場合は、収穫適期幅の中でやや遅めに収穫しましょう！

【地区別の積算気温表】 収穫適期：○の範囲（△成熟期、○収穫時期）

| 出穂期 | 地域名 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 |
|------|----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 4/21 | 寺泊 (夏戸) | 653 | 672 | 691 | 710 | 729 | 748 | 768 | 787 | 807 | 826 | 846 | 866 | 886 | 906 | 927 | 947 |
| | | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 4/21 | 和島 (島崎) | 653 | 672 | 691 | 710 | 729 | 748 | 768 | 787 | 807 | 826 | 846 | 866 | 886 | 906 | 927 | 947 |
| | | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 4/21 | 出雲崎 (乙茂) | 653 | 672 | 691 | 710 | 729 | 748 | 768 | 787 | 807 | 826 | 846 | 866 | 886 | 906 | 927 | 947 |
| | | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 5/1 | 出雲崎 (神条) 【消雪早】 | 521 | 540 | 559 | 578 | 598 | 617 | 636 | 655 | 675 | 695 | 714 | 734 | 755 | 775 | 795 | 815 |
| | | | | | | | | | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/3 | 出雲崎 (神条) 【消雪遅】 | 492 | 511 | 530 | 549 | 568 | 587 | 606 | 626 | 645 | 665 | 685 | 705 | 725 | 745 | 766 | 786 |
| | | | | | | | | | | | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4/26 | 三島 | 629 | 649 | 669 | 689 | 709 | 729 | 749 | 770 | 790 | 811 | 832 | 853 | 874 | 895 | 916 | 937 |
| | | | | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |

※上表は積算気温による収穫適期の目安です。ほ場条件や今後の天候等により前後する場合がありますので、現場確認（子実水分：30%以下）を行った上で適期収穫に努めてください。

(3) 「適期収穫による品質低下の防止」

早刈り厳禁! 近年は、出荷量の大半が「未熟粒」の混入（⇒“早刈り”が主要因）により格落ちしている状況です。

- 刈り取り前のほ場で、赤かび・麦角粒の発病状況を確認し、一定以上発病がある場合には、刈り分けしてください。
- 週間予報等を確認し雨天が続く場合は、刈遅れによる「かび粒」増加を防止するため、“早め”に収穫してください。



2. 施設稼働計画（予定）

- 各生産者へ刈取時期を周知いたします
- (1) 荷受期間 北部地区 和島 RC：6月1日（月）～
北部地区 出雲崎 RC：6月1日（月）～ } (RC荷受後JAで長岡西CEに運搬します)
- 中部地区 長岡西 CE：6月1日（月）～
- (2) 荷受時間 北部地区 9：00～17：00まで
中部地区 9：00～18：00まで
- （※ 刈り取り時間は出来る限り遅く開始するようお願いします。）

農作業事故には、十分気をつけてください!!

【施設利用にあたっての注意事項】

- 刈り取りに際して事前に刈り取り開始日の連絡をお願いします！（今後の天候により収穫期が前後することも想定されます。期間の変更も検討させていただきますのでご相談下さい。）
- 品質事故防止のため、荷受水分が30%を超えた場合は刈り取り作業及び持ち込みの停止を指示させていただきます。刈り取り前に、ほ場数ヶ所から平均的な穂を数点お持ち込みいただき、水分を確認のうえ、作業を開始していただくようお願いします。
- 収穫適期・天候の状況等を踏まえ、好天が続く時期に刈り取るようお願いします。
- 「麦角粒」混入防止のため、収穫前にほ場内の発生状況を確認し刈取可否を判断して下さい。
- 「赤かび病」混入防止のため、発病率が0.03%以上のほ場は必ず刈り分けして下さい。荷受検査で「赤かび病・麦角粒」の混入が確認された場合は別処理対応となります。

～～営農情報のお問い合わせは、お気軽に最寄りの地区営農センターへ～～