

幼穂形成期・出穂期は平年より4日程度早い見込み!

～ 穂肥を適期に施用し品質向上を図りましょう! ～

1. JA えちご中越 越後ながおか地区管内の生育状況(6月18日現在)

- ①栃尾地域: 草丈は並み、茎数は多い、生育の進みは早い、葉色はやや濃い。
②山古志地域: 草丈は長い、茎数は多い、生育の進みは並み、葉色は並み。

	コシヒカリ			
	草丈 (cm)	茎数(本/㎡)	葉数 (L)	葉色(SPAD)
栃尾地区全体	37	385	8.5	38.4
山古志・太田	45	333	7.6	37.9
生育目標 (6/20)	37	300	7.8	38.0

2. 出穂期の予想と穂肥時期の目安

(6月18日現在 長岡農業普及指導センター)

		予 想		穂肥時期の目安(出穂前日数)			施肥量
		幼穂形成期	出穂期	1 回目	2 回目	3 回目※1	
コシヒカリ	栃尾平坦部	7月8日	7月31日	7月13～16日 (18～15)	7月21日 (10)	7月28日 (3)	けい酸入り エコ・5-5 専用穂肥 上限施用量 25kg/10a
	栃尾山間部	7月11日	8月2日	7月16～19日 (18～15)	7月24日 (10)	7月31日 (3)	
	山古志・ 栃尾半蔵金	7月13日	8月5日	7月18～21日 (18～15)	7月26日 (10)	8月2日 (3)	
こしいぶき		6月26日	7月19日	6月26日 (23)	7月5日 (14)	7月16日 (3)	
こがねもち		7月2日	7月25日	7月7～10日 (18～15)	7月15日 (10)	7月22日 (3)	尿素 1回目:4.5～5.5kg 2回目:4.5～5.5kg 合計 9～11kg/10a
五百万石		6月22日	7月15日	6月25日 (20)	7月3日 (12)	7月12日 (3)	
ゆきみらい なつひめ		6月20日	7月13日	6月20日 (23)	6月30日 (13)	7月10日 (3)	

※1 高温の年や、穂肥を2回施肥しても葉色が上がらない場合、窒素上限施用量内で3回目の穂肥を出穂の3日前(はしりが見えるころ)までに施用してください。

※早生品種は5月1日～5日稚苗移植、中晩生品種は5月10日～15日稚苗移植で予想しています。

田植えが5日前後すると、出穂は2日程度前後します。今後の気象条件で予想は変わります。

※コシヒカリの栃尾山間部、山古志・栃尾半蔵金はJAえちご中越で追加記載。

※新之助については後日発表の予定です。

お問い合わせ先 ながおか営農センター ☎0120-915882 とちお営農センター☎0120-915885

3. 「こしいぶき」の穂肥について

- ◎ 1 回目穂肥は遅れない！ ◎ 2 回目は**確実に実施**する！
 ◎ 葉色（SPAD値36、葉色カラスケール4.5）を維持！（8/10頃まで）

【出穂期が7月19日の場合】

<こしいぶき穂肥施用時期>

<けい酸入りエコ・5-5専用穂肥施用量>

1 回目：6月26日頃（出穂23日前）

1 回目 8kg/10a

2 回目：7月 5日頃（出穂14日前）

2 回目 10kg/10a

水稻慣行栽培基準の変更により高温対策として化学肥料使用量が増加されました。

	越後の輝き有機 50 元肥 基肥上限量(kg/10a)	けい酸入りエコ・5-5 専用穂肥 穂肥上限量18kg/10a
分施(改正前)	30 kg	18 kg
変更 ↓ 穂肥上限量 25 kg/10a		
分施(改正後)	30 kg	18 kg
		7 kg
		高温対策 追加穂肥


※施用量等については、営農センターにご相談願います。

4. 中干し終了後の飽水管理


中干しは、出穂の1ヵ月前までには終了し、飽水管理へ移行してください。



(例1) 圃場の水持ち2～3日程度の場合の飽水管理



(例2) 排水不良圃場の場合の飽水管理（水持ち：5日以上）



<注意> 1回のかん水で3日以上湛水するような水持ちの良いほ場(水はけが悪い)では、**湛水状態にせず、3日間湛水・3日間落水を繰り返す間断かん水とし、根の活力維持につとめてください。**

☆間断かん水☆ 湛水状態と落水状態を数日間隔で繰り返す水管理法。（例：3湛3落 等）