

早生品種の出穂期予想と穂肥施用のめやす

1. 6月18日現在の水稻生育状況（なんかん北管内調査圃場平均）

- コシヒカリ 草丈:並 茎数:少 葉数:並 葉色:並
○ こしいぶき 草丈:並 茎数:少 葉数:やや遅い 葉色:並

品種	草丈 (cm)		茎数 (本/m ²)		葉数 (葉)		葉色 (SPAD)	
	本年	指標	本年	指標	本年	指標	本年	指標
コシヒカリ	38.5	40	360.1	420	8.5	8.6	38.3	40.0
こしいぶき	37.3	38	394.1	460	8.7	9.2	41.4	41.5

2. 出穂期予想と穂肥施用のめやす（6月18日現在） 出穂期予想は今後の気象により変動します。

品種	出穂期	穂肥 1 回目			穂肥 2 回目		
		施用時期	出穂前日数	窒素量 (kg/10a)	施用時期	出穂前日数	窒素量 (kg/10a)
なつひめ	7/10	6/22~25	16~19	1.0~2.0	6/27~29	12~14	1.0~2.0
五百万石	7/19	6/29	20	0.5~1.0	7/7	12	0.5~1.0
わたぼうし	7/19	6/27~29	22~20	1.0~1.5	7/7~9	12~10	1.0~1.5
ゆきん子舞	7/22	6/27~29	25~23	2.0~3.0	7/8	14	2.0~3.0
こしいぶき	7/24	7/1	23	1.0~1.5	7/10	14	1.0~1.5

3. 幼穂長の測り方

- ほ場内の平均的な生育の稲を3株程度選ぶ。
- 1株の中で、最も長い茎を株元から引き抜く。
- カッター等で茎を縦に割り、幼穂長を確認する。



【幼穂長と出穂前日数の関係】

幼穂長 (cm)	出穂前日数
0.02	30
0.1	24
0.13	23
0.2	20
0.5~1.0	18
4.0~6.0	12

4. 穂肥施用時のポイント

- 穂肥施用時は肥効を高めるため湛水後、適期適量散布。
- 圃場ごとに生育差があるので 必ず幼穂長を確認。

こしいぶき
1 回目適期

5. 葉いもち防除と斑点米カメムシ対策

- 圃場を見回り、いもち病の早期発見に努め、病斑を見つけ次第防除しましょう。
- カメムシが増えにくい環境を作るために、雑草の種子が結実しない間隔で畦畔や農道等の草刈りの徹底。

LINE で稲作・米穀情報の発信をやっています！

方法① ID 検索

[友達追加]>[検索]で

@287vzxcx を入力

方法② QR コードを読み取る

[友達追加]>[QR コード]で、

右の QR コードを読み取る。



【お問い合わせ先】

なんかん北営農センター
米穀課

TEL：0256-47-1429