

売れる米づくり技術情報No.4

～なんかん米 光る粒張り 粒ぞろい～

令和8年6月25日
J A え ち ご 中 越
なんかん南営農センター

早生品種の穂肥時期が近づいてきました。幼穂長を確認して、 適期に適量の穂肥を施用しましょう！

1. 6月18日現在の水稻生育状況（なんかん南平均：長岡地区指標値を使用）

- 田植え時期の悪天により一時生育が停滞しましたが、その後の好天により生育は旺盛になっております。
- 田植時期、圃場により生育差が大きくなっております。（コシヒカリ茎数 最多：655本/㎡ 最小：234本/㎡）

品種	草丈（cm）			茎数（本/㎡）			葉数（葉）			葉色（SPAD）		
	本年	前年	指標	本年	前年	指標	本年	前年	指標	本年	前年	指標
コシヒカリ	41.7	35.0	37	452	283	400	9.3	8.0	8.2	39.1	40.4	41.0
こしいぶき	41.7	36.0	40	449	352	430	9.6	8.4	8.7	42.8	44.3	42.0

2. 幼穂形成期・出穂期予想と穂肥施用のめやす 【6/18 現在 長岡地域振興局管内平場地区】

- 長岡地域振興局発表の予想になります。あくまで予想のため圃場の状況に応じ対応してください。
- 1回目穂肥は遅れずに施用し、基肥一発肥料でも、葉色の低下がみられる場合は追肥を実施しましょう。

品 種	幼 穂 形成期	出穂期	穂肥 1 回目			穂肥 2 回目		
			施用時期	出穂前 日 数	窒素量 (kg/10a)	施用時期	出穂前 日 数	窒素量 (kg/10a)
なつひめ	6/20	7/13	6/20	23	2.0	6/30	13	1.0～2.0
ゆきん子舞	6/25	7/18	6/23～6/25	25～23	2.5	7/4	14	2.5
こしいぶき	6/26	7/19	6/26	23	1.0	7/5	14	1.5
わたぼうし	6/23	7/16	6/24～6/26	22～20	1.0～1.5	7/4～7/6	12～10	1.0～1.5
コシヒカリ	7/8	7/31	7/13～7/16	18～15	1.0	7/21	10	1.0～1.5

コシヒカリ等の中生品種の詳しい出穂期予想は次号No.5にて掲載いたします。

◎品種・圃場ごとに生育差があるので **必ず幼穂長を確認して**
穂肥の施用時期を判断しましょう。


【幼穂長と出穂前日数の関係】

こしいぶき穂肥1回目のめやす

幼穂長(cm)	0.02	0.1	0.13	0.2	0.5～1.0	4.0～6.0
出穂前日数	30	24	23	20	18	12

【幼穂長の測り方】

- ①ほ場内の平均的な生育の稲を3株程度選ぶ。
- ②1株の中で、最も長い茎を株元から引き抜く。
- ③カッター等で茎を縦に割り、幼穂長を確認する。



3. 中干しと合わせ溝切り作業の実施をお願いします。

- まだ中干しに入っていない圃場が多く見受けられます。好天がつづき急速に残渣の腐熟が進みワキが発生しますので、**茎数が不足しているほ場でも早めに中干し作業を行ってください。**
- 中干し終了以降は、間断かん水から徐々に飽水管理へ移行しましょう。根腐れの発生につながるので、長期間にわたる湛水は避けましょう。
- 高温時の迅速な水回しや、排水能力向上の為に**溝切り**も合わせて実施しましょう。

4. 葉いもち防除の徹底と、病害虫対策をお願いします。

- わたぼうし、あきだわら、新之助等のいもち病に弱い品種、多肥栽培を行っている圃場では、圃場を見回っていてもち病の早期発見に努め、病斑を見つけ次第防除しましょう。**※補植苗の取り残しも確認しましょう。**
- 見歩き調査にて畦畔にカメムシの発生が散見されております。カメムシが増えにくい環境を作るために、雑草の種子が結実しない間隔で畦畔や農道等の草刈りを行いましょう。
- 必要に応じて中・後期除草剤を散布し、ノビエ・ホタルイ等、水田内雑草の除草を徹底しましょう。

【お問い合わせ先】

なんかん南営農センター米穀課 0258-61-2903

