

水稻緊急情報

追加穂肥について

J A えちご中越 さんとう営農センター
R8.7.22 発行 TEL : 0258-41-2887

コシヒカリ出穂期は近年で最も早い**7/28 前後!**
早急な生育確認に加え、**追加穂肥**を検討しましょう!

1. 7/21 現在：コシヒカリの生育状況

地区	田植日	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉齢 (葉)	葉色 (SPAD)
寺泊	5/ 6	95.6	396	12.9	34.9
和島	5/ 8	86.9	476	12.8	33.3
出雲崎	5/ 5	88.1	390	13.0	31.5
三島	5/ 5	84.7	381	12.6	30.8
与板	5/12	85.6	352	12.3	27.8
こしじ	5/11	92.9	376	12.5	35.1
平均	5/ 8	89.0	421	12.7	32.5
7/21 指標	—	79.0	410	12.2	34.0
平均と 指標値比	—	112% 長い	103% 並み	6 日前後 早い	-1.5 やや淡い

① コシヒカリの生育は平年比で、草丈は**長く**・茎数は**並み**、葉齢は**6 日前後早まり**、葉色は**やや淡い**です。

→ 葉齢比では草丈・茎数は**並み**、葉色は**並み～やや淡い**。
出穂期は**7 月 28 日前後**を予想しています。

② 上記のとおり **2 回目穂肥時期（出穂 10 日前）**を逸している可能性が高いため、**早急に生育を確認し**、今後の異常高温に備えて**追加穂肥を検討**しましょう！

③ 出穂期の葉色値 **33** を目標とした 2 回目穂肥目安

出穂 10 日前 葉色値	10a あたり 必要窒素量	10a あたり施肥例： 越後の輝き有機 50 穂肥
28 (極めて淡い)	2.47 Nkg	20.6 kg
29	2.16 Nkg	18.0 kg
30	1.84 Nkg	15.3 kg
31	1.52 Nkg	12.7 kg
32 (やや淡い)	1.20 Nkg	10.0 kg

2. 3 回目穂肥（追加穂肥）の判断について

出穂 10 日前の穂肥施用後も、コシヒカリの葉色が薄い（葉色 33 以下の）場合は、出穂期 6 日前頃を**判断期限**とし、**追加穂肥**を検討しましょう！ また、**施肥効果を高めるため飽水管理**を徹底し、品質向上を図りましょう！

特栽米基準内(化学窒素 3.5Nkg 以内)で施用する！

判断時期と 葉色値目安	残りの 化学窒素量	使用肥料例	10a あたり 施用目安
出穂期 6 日前 葉色 33 以下	0.5 Nkg	越後の輝き 有機 50 穂肥	出穂期 3 日前 8.3 kg
		さんとう 穂肥有機	出穂期 3 日前 4.0 kg
	0 Nkg ※有機質 100%肥料を使用する	鶏ちゃんパワー	出穂期 6 ～ 3 日前 23.0 kg
出穂期 3 日前 葉色 31 以下	0.5～1.0Nkg	ドローン用 尿素 43	出穂期 3 日前 1.1～2.3 kg
【出穂期の定義】 出穂期とは、圃場の 40～50%が 出穂した状態を指します。 （右写真を参照にしてください） →出穂期 3 日前は圃場の一部で穂 が出ている（走り穂）状態です。			

3. J A 生育診断チームは 7 月下旬まで活動します！

皆さまからのご要望で現地ほ場に出向き、水稻の幼穂長や草丈・茎数・葉色等の生育診断を行い、穂肥施用と栽培管理を個別に指導します。**予約制**となりますので、各営農センターまでご連絡いただき、穂肥の判断に是非ご活用下さい！！

4. あぐりセンター店舗休業日のお知らせ

8 月 8 日(土)～8 月 16 日(日)の**土・日・祝日**は、 ©フンジャ
店舗休業日となります。資材購入時にはご注意ください。

また、**7 月 31 日(金)**は棚卸作業により**午後休業**いたします。